

QUESTIONARIO N. 3

1. Il consenso può essere revocato dal paziente:			
A	B	C	D
solo se l'atto medico è arrestabile senza imminente pregiudizio per la sua salute	solo in presenza dell'avvocato	solo se l'atto medico non è ancora iniziato	in qualsiasi momento e tale decisione deve essere rispettata subito

2. La colpa professionale è legata a:			
A	B	C	D
imperizia, negligenza e imprudenza, nonostante l'osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline	dolo	imperizia, negligenza, imprudenza	preterintenzione

3. Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza			
A	B	C	D
Infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi	Infezione delle vie urinarie, gastroenteriti, infezioni della ferita chirurgica, tubercolosi	Tubercolosi, infezione della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie	Polmoniti, tubercolosi, infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica

4. Quale tipo di sensibilità si valuta muovendo passivamente l'arto di un paziente e chiedendogli in quale posizione si trova?			
A	B	C	D
Batiestesica	Pressoria	Tattile superficiale	Cinestesica

5. Il muscolo pedidio è detto anche:			
A	B	C	D
quadrato plantare	accessorio del flessore lungo delle dita	flessore breve delle dita	estensore breve delle dita

6. Quali fra le seguenti non è una possibile complicanza precoce delle fratture?			
A	B	C	D
Sindrome compartimentale	Tromboembolia	Ritardo di consolidazione	Infezioni

7. Che cos'è il fast track?			
A	B	C	D
Un percorso riabilitativo dopo intervento chirurgico di protesizzazione	Il riallenamento allo sforzo	Una prova di valutazione utilizzata nelle PCI	Un tipo di contrazione muscolare

8. Un paziente in terapia intensiva sta effettuando esercizi fisioterapici. Quando è opportuno interrompere il trattamento?			
A	B	C	D
quando il saturimetro indica valori inferiori a 85%-90%	quando il saturimetro indica valori pari a circa il 97%	Quando il saturimetro indica valori pari a 95%	quando il saturimetro indica valori pari a circa 90%

9. Quale fra le seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva?			
A	B	C	D
La PEP	L'ELTGOL	La respirazione a labbra socchiuse	Il flutter

10. La somministrazione di farmaci cannabinoidi tramite spray orale trova applicazione:			
A	B	C	D
Nel paziente oncologico terminale	Nel paziente affetto da SLA	Nel paziente affetto da SM	Nel paziente affetto da dolore cronico

QUESTIONARIO N. 3

11. L'incompetenza dello sfintere uretrale provoca:			
A	B	C	D
incontinenza da sforzo	incontinenza da vescica neurogena	vescica cronicamente iperdistesa	aumento della contrattilità della vescica

12. Quale fra le seguenti non rientra fra le caratteristiche tipiche dell'algoneurodistrofia?			
A	B	C	D
Ipersudorazione	Striature ungueali	Deformità articolari	Fenomeni osteoporotici

13. Nel trattamento dell'algoneurodistrofia occorre:			
A	B	C	D
proteggersi per evitare il contagio	usare metodiche di rinforzo muscolare	non scatenare il dolore	attendere la fase degli esiti

14. Quale fra i seguenti lobi cerebrali è deputato alle funzioni mnesiche?			
A	B	C	D
Parietale	Limbico	Temporale	Frontale

15. Quale delle seguenti situazioni non è tipicamente caratterizzata da edema monolaterale non doloroso?			
A	B	C	D
Prolungata immobilità	Neuropatia diabetica	Linfedema	Sindrome post-trombotica

16. Il PRI è ordinariamente redatto:			
A	B	C	D
dall'équipe riabilitativa	dal MMG	dal fisioterapista	dal fisiatra

17. L'utilizzo del cicloergometro per pazienti post infartuati o cardio-operati viene effettuato dopo:			
A	B	C	D
3-5 giorni dall'intervento	una settimana dall'intervento	2 settimane dall'intervento	1 mese dall'intervento

18. Quali zone del polmone risultano particolarmente interessate dalla polmonite da SARS-CoV-2?			
A	B	C	D
Gli apici	Tutti i campi polmonari con un quadro di interstiziopatia	Il polmone sinistro	Le sole regioni posteriori

19. Quale fra i seguenti interventi è da utilizzare solo nei casi strettamente necessari per i pazienti affetti da Covid-19 in fase acuta?			
A	B	C	D
La disostruzione bronchiale	La respirazione diaframmatica	Il rinforzo muscolare	L'adozione di presidi antidecubito

20. La mascherina FFP3 è in grado di filtrare particelle fino a 0,6 nm nella percentuale del:			
A	B	C	D
99%	90%	80%	70%

21. Cosa si intende per core competence:			
A	B	C	D
L'insieme delle scale di valutazione	L'insieme di esercizi per la stabilizzazione dei muscoli del tronco	Le competenze fondamentali della professione	Le tecniche di tipo manuale

22. All'interno di un ragionamento clinico mirato a riconoscere una possibile eterometria degli arti inferiori, quale tra i seguenti test potrebbe tornare utile?			
A	B	C	D
Test di Borg	Test di Mc Murray	Test di Thompson	Test di Sharmann

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA (CAT. D)**

QUESTIONARIO N. 3

23. Il test di Craig è utile per misurare clinicamente:			
A	B	C	D
l'angolo di copertura dell'acetabolo	l'angolo di inclinazione del collo del femore (coxa vara-coxa valga)	l'angolo di antiversione/retroversione del collo del femore	l'angolo di antiversione dell'osso iliaco

24. La sindrome del tunnel carpale può essere valutata attraverso:			
A	B	C	D
l'upper limb tension test	il test di Phalen	il test di compressione di Spurling	il test di Patrick

25. Cosa si intende per "rischio clinico"?			
A	B	C	D
La possibilità che un paziente subisca danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte	Un evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile	Un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del sistema sanitario	E' il processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica sia quella gestionale che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni che consentono di identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti

26. Quando il paziente ignora il lato lesso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova di fronte a un problema di:			
A	B	C	D
agnosia	emisomatoagnosia	nosoagnosia	prosopagnosia

27. La sindrome di Wallenberg è espressione di una lesione localizzata a livello:			
A	B	C	D
del tronco encefalico	cortico-sottocorticale	capsulare	bulbare

28. Quando un paziente si trova in stato vegetativo:			
A	B	C	D
risponde al dolore ritraendosi volontariamente	i suoi occhi sono sempre chiusi	apre gli occhi in risposta al comando verbale	può presentare occhi aperti o chiusi

29. Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico:			
A	B	C	D
della sostanza nera	dei fasci piramidali	del cervelletto	della corteccia cerebrale

30. Quale fra questi test non è utile a misurare il grado di estensibilità di un muscolo o di una catena di muscoli:			
A	B	C	D
Test di Patrick	Test di Kendall	Test di Ober	Test di Ely